

- Lapworth, Charles, on British graptolites, 15^o.
- Le Boutillier, Philip, cited, 136^r, 139^o, 160^o.
- Leperditia alta, 196^o, 198^r, 210^o, 213^o, 214^o, 215^o, 215^r, 215^o, 216^o, 221^o, 268.
- altoides, 347^o, 347^r, 348^o.
- jonesi, 351^o, 353^o, 355^o.
- scalaris, 351^o, 351^r, 356^o.
- Leptaena rhomboidalis, 142^o, 145^o, 156^o, 160^o, 181^r, 183^o, 183^o, 185^o, 195^o, 197^o, 199^o, 200^o, 208^o, 212^o, 219^o, 219^o, 220^o, 222^o, 223^o, 223^o, 224^o, 224^o, 224^r, 224^o, 225^o, 225^o, 225^o, 226^o, 227^o, 227^o, 230^o, 232^o, 232^r, 232^o, 233^o, 233^o, 233^o, 240^o, 264, 351^o, 351^r, 352^o.
- Leptaenisca adnascens, 353^r.
- Leptocoelia flabellites, 143^o, 146^o, 148^o, 149^o, 187^r, 188^o, 189^o, 189^o, 196^o, 198^o, 199^o, 200^o, 200^o, 204^o, 206^o, 228^o, 228^o, 229^o, 234^o, 253^o, 254^o, 264.
- Leptodomus canadensis, 146^r.
- Leptostrophia blainvillii, 145^o.
- irene, 143^r, 145^o, 149^o, 149^o, 151^o.
- magnifica, 142^o, 145^o.
- oriskania, 145^o, 152^o, 185^o, 227^o, 240^o, 264.
- tullia, 143^r, 145^o.
- Lichas (Terataspis), 161^r.
- grandegrevensis *nov.*, 147^o.
- ptyonurus, 357^o.
- Lichenalia torta, 180^o, 181^o, 184^o, 196^r, 207^o, 211^o, 212^o, 212^o, 216^o, 217^r, 218^o, 218^o, 218^r, 219^o, 232^o, 232^o, 238^o, 263.
- Limekiln massive, 160^o-61^o.
- Lindsley, J. G., cited, 344^r.
- Lingula, 182^o, 239^o-40^o.
- sp.*, 222^o, 222^r, 223^o, 224^o, 224^r, 234^o, 264.
- elliptica *nov.*, 142^o, 144^o.
- perlata?, 234^o.
- rectilatera, 142^r, 144^o.
- spathata, 142^r, 144^o.
- Lioclema cellulosum, 181^o, 207^o, 219^o, 238^o, 263.
- ponderosa, 263.
- ponderosum, 207^o, 238^r.
- Lithographer, appointment of, 21^o.
- Localities, alphabetic list, 27^o-30^o;
New York according to counties,
30^o-31^r; record of, 32^o-42^o.
- Logan, Sir William, cited, 18^o, 19^r, 138^o, 139^o, 139^o, 140^o, 140^o, 141^r, 149^o, 150^o, 165^o, 167^o, 168^o.
- Loxonema?, 214^r.
- sp.*, 209^o, 213^o, 215^o, 215^o, 221^o, 221^r, 230^o, 267.
- ? hebe, 146^o.
- jerseyense, 185^o, 188^o, 220^o, 227^o, 228^r, 267.
- Luther, D. D., stratigraphic determinations, 9^r.
- Lyellia, 161^r.
- Lyriocrinus, 277^o.
- ? beecheri *sp. nov.*, 272^r, 277^o-80^r.
explanation of plate, 364.
figure, 278, 279.
- Machaera costata**, 261^o.
- Malocystites, 270^o.
- barrandi, 271^o, 271^r.
- emmonsii *sp. nov.*, 270^o-77^r.
explanation of plate, 360.
figure, 274, 276.
- Manlius limestone, 179^o, 179^o-80^o, 193^o, 194^o, 195^o, 196^o, 198^o, 202^o, 203^o, 342^o, 350^o, 351^o, 353^o; similar in New York and New Jersey sections, 201^r;
upper, 209^r, 212^o, 213^o, 214^o, 216^o, 216^o, 220^o, 221^o, 222^o; lower, 213^o, 214^o, 215^o, 216^o; fauna, 262.
- Map of Schoharie region, 4^o.
- Maps, stratigraphic and areal maps, 17^r-18^r.
- Marcellus limestone, 203^o.
- Mather, W. W., cited, 175^o, 176^o, 227^o, 343^o, 343^o, 344^o, 346^o, 352^o.
- Mattimore, H. S., assistance from, 9^r.
- Medina sandstone, 343^o.
- Megalanteris, 140^o.
- ovalis, 187^o, 189^o, 190^r, 228^o, 246^o, 264.
- plicata *nov.*, 143^o, 146^o, 148^o, 149^o, 149^o, 169^o.
- Megambonia aviculoidea, 209^o, 213^o, 256^o, 267, 350^o.
- crenistriata, 143^o, 146^o.
- nitidula *nov.*, 143^o, 146^o.