

- Memoirs published during year, 9^o-10^o.
- Meristella* *sp.*, 230^o, 232^o, 232^o, 255^o, 264.
- acerra* *nov.*, 145^o.
- arcuata*, 169^o.
- laevis*, 181^o, 187^o, 197^o, 207^o, 207^o, 208^o, 212^o, 220^o, 222^o, 222^o, 223^o, 223^o, 223^o, 224^o, 224^o, 224^o, 225^o, 225^o, 225^o, 232^o, 232^o, 233^o, 255^o, 264.
- lata*, 184^o, 185^o, 186^o, 188^o, 189^o, 189^o, 196^o, 198^o, 199^o, 206^o, 206^o, 212^o, 227^o, 228^o, 229^o, 229^o, 229^o, 255^o, 264.
- var. complecta* *nov.*, 143^o, 145^o.
- princeps*, 212^o, 223^o, 232^o, 255^o, 264.
- Michelinia* *cf. lenticularis*, 156^o.
- Migration of faunas, evidence of, 203^o-4^o.
- Modiella modiola* *nov.*, 146^o.
- pygmaea*, 146^o.
- Modiolopsis*, 286^o-87^o.
- subquadrilateralis* *sp. nov.*, 286^o-87^o.
- explanation of plate, 366.
- Modiomorpha gaspesia* *nov.*, 146^o.
- Monograptus* *cf. clintonensis*, 156^o.
- Monotrypa corrugata*, 354^o, 354^o, 356^o, 356^o.
- tabulata*, 238^o, 263.
- Monotrypella* ? *abrupta*, 182^o, 209^o, 223^o, 238^o-39^o, 263.
- tabulata*, 195^o.
- Mt Joli massive, 155^o.
- Mt Moreno, restudy of structure, 6^o.
- Mt Ste Anne, 168^o-69^o.
- Mytilarca canadensis*, 146^o.
- nitida*, 146^o.
- Nanno**, 322^o-26^o.
- aulema*, 298^o, 300^o, 300^o, 317^o, 320^o, 322^o, 323^o, 324^o, 324^o, 325^o, 326^o, 326^o, 338^o.
- fistula*, 326^o.
- pygmaea*, 326^o.
- See also *Endoceras* (Nanno).
- Naples Fauna in Western New York, part 2, 10^o.
- Nartheoceras*, 325^o.
- New Scotland beds, 179^o, 182^o-83^o, 193^o, 194^o, 195^o, 196^o, 199^o, 200^o, 201^o, 203^o, 203^o; lower, 207^o, 208^o, 212^o, 212^o, 219^o, 220^o, 222^o, 222^o, 223^o, 223^o, 223^o, 224^o, 231^o; upper, 206^o, 208^o, 208^o, 212^o, 212^o, 220^o, 220^o, 224^o, 225^o, 225^o, 225^o, 231^o, 232^o; fauna, 262.
- Niagara shale, 247^o.
- Nickles, J. M., cited, 204^o.
- Nucleospira*, 199^o.
- concentrica*, 223^o, 254^o-55^o, 264.
- elegans*, 185^o, 186^o, 187^o, 207^o, 227^o, 233^o, 233^o, 255^o, 264.
- ventricosa*, 146^o, 207^o, 219^o, 220^o, 255^o, 264, 355^o.
- Nuculites barretti* *sp. nov.*, 261^o, 261^o, 267; figure, 261.
- gaspensis* *nov.*, 146^o.
- Oatka Salt Co., 20^o.
- Office work, 9^o-14^o.
- Oncoceras ovooides*, 347^o, 348^o.
- Onondaga limestone, 179^o, 192^o-93^o, 194^o, 229^o, 230^o, 231^o; wanting in Maryland, 201^o.
- Ontaric section of eastern New York, by C. A. Hartnagel, 342-58.
- Orange county, upper Siluric and lower Devonian faunas of Trilobite mountain, Orange county, by H. W. Shimer, 173-269.
- Orange county sections, 350^o-57^o.
- Orbiculoidea, 182^o.
- sp.*, 144^o, 219^o, 222^o.
- ampla*, 185^o, 227^o, 240^o, 264.
- discus*, 223^o, 265.
- nov. cf. grandis*, 142^o, 144^o.
- jervisensis*, 188^o, 199^o, 206^o, 226^o, 228^o, 228^o, 240^o, 265.
- cf. tenuilamellata*, 356^o.
- Oriskany fauna, correlation study, 14^o.
- Oriskany limestone, 179^o, 184^o-92^o, 194^o, 194^o, 196^o, 197^o, 199^o, 200^o, 202^o, 203^o, 229^o; lower, 185^o-88^o, 205^o, 205^o, 206^o, 212^o, 220^o, 226^o, 226^o, 227^o, 228^o, 234^o; upper, 188^o, 205^o, 206^o, 206^o, 212^o, 220^o, 228^o, 228^o, 228^o, 229^o, 234^o; thickness, 198^o; fauna, 262.
- Oriskany-Esopus swamp, 191^o-92^o.